

# Poliklinisk njurbiopsi vid tumörmisstanke

## Bakgrund

Njurbiopsi på urologen används i utvalda fall för att utreda oklara tumörer i njurens parenkym. För att tidigt upptäcka komplikationer observeras patienten på avdelningen efter ingreppet.

## Förberedelse

- Utsättning av blodförtunning (se separat rutin)
- PAD-remiss läggs upp och skrivs men signeras och skickas ej
- Fasta 4 timmar
- Fungerande PVK
- Provtagning (urinsticka, blodstatus, kreatinin, PK(INR), APTT, b-glukos hos diabetiker)
- Kontraindikation: PK >1,5, APTT > 1,5x normalvärdet, TPK <50
- Puls + blodtryck
- Blodtryck ska ej överstiga 150/90
- Premedicinering
- Oxycodone 2,5 - 5 mg sc
- Stesolid 5 mg per os

## Tillvägagångssätt

- Minst 2 mellannålsbiopsier med 18-G-nål

## Eftervård

- Observation 4 timmar i sängläge [1]
- Fasta 4 timmar efter ingreppet
- Puls och blodtryck efter ankomst till avdelning och därefter varje halvtimme
- Patienten kissar i flaska/bäcken och vid makrohematuri kontaktas läkare

## Efter hemgång

- Ansvarig läkare kontaktar patienten när PAD-svar finns