

Synacthentest - Patientinformation Reumatologmottagningen

Du har blivit ordinerad ett s.k. Synacthentest för att avgöra om den egna kortison-produktionen är tillräcklig. Testet är enkelt och ofarligt.

Förberedelser

Om du använder något slags kortisonmedicin så måste det ha gått minst 12 timmar sedan Du tog sista tabletten innan testet görs (t.ex. Hydrokortison), eller helst 24 timmar vid långverkande kortison (t.ex. Prednisolon). Annars får man inte rättvisande värden. Du behöver inte vara fastande.

Hur utförs testet?

Testet tar drygt en timme. Man börjar med att ta ett blodprov för bestämning av kortisol. Därefter sprutas in i en blodåder på armen en liten mängd (250 µg) syntetiskt framställt hypofyshormon (ACTH = Synacthen) som normalt ska stimulera kortisonproduktionen. Nytt blodprov tas sedan efter 30 respektive 60 minuter efter insprutningen. Testet är därefter klart och proverna analyseras inom några dagar.

Finns det några biverkningar?

Ibland kan snabbt övergående lättare illabefinnande förekomma men de flesta märker ingenting av det insprutade hormonet. I mycket sällsynta fall har en allergisk reaktion inträffat.

Dessa gånger har man gett det till personer som tidigare reagerat med stark allergisk reaktion. Därför, om Du har mycket stark allergisk benägenhet diskutera detta med Din läkare före testet.

Kontakt vid frågor:

Reumatologmottagningen Sunderby sjukhus,
Telefon: 0920-28 39 00 alternativt via internet www.1177.se – Vårdguidens e-tjänst.