

Acromioplastik - anestesi kort, AnOpIVA Sunderby sjukhus

Berörda enheter

- Anestesi, Operationsavdelningen, Sunderby sjukhus

Anestesiform

- Generell anestesi, intubationsnarkos
- Interscalen plexus

Läkemedel

- Atropin, Betapred, Propofol, Fentanyl, Celokurin, Sevorane

Typ av tub och dess läge

- Rak tub, motsatt håll från operationsområdet.

Operationsbord

- Axelbord

Operationsläge

- Solstolsläge (Beach chair läge)
- Låt patienten känna av läget och justera efter behov. Remmar för benen spänns fast. Patienten bör ligga ca 2cm för högt upp i nackstödet då narkosinduktion gör att man sjunker ner en aning.
- Tippa stolen bakåt utan att förändra läget inför sövning.

Postoperativ destination

- Vanligtvis UVA
- Vid behov kontrollera med ansvarig anestesi läkare

Risk	Åtgärder
Trycksår, nervskador	Avlasta armar. Hälarna ska vila på fotstödet, inte trycka. Fixera patienten med bälte.
Torra ögon	Celluvisc ögon. Tejpa vid behov.
Hypotermi	Kontinuerlig tempmätning. Bair-hugger vid behov. Se rutin om hypotermiförebyggande.

Övrigt

- Opti-gard glasögon. Mollelast virat runt huvudet för att inte patienten ska förflyttas när operatören drar i axeln.
- Justera nackstödet så inte nacken blir översträckt.
- Bladderscan om operationstid >2h