

Femoralisblockad på höftfrakturer

Berörda enheter

IVAK personal Piteå Älvdals sjukhus

Syfte

Säkerställa/optimera smärtlindring hos patient med konstaterad höftfraktur-patient inför transport till annat sjukhus, i väntan på operation.

Förberedelse

Bedövningen läggs i normalfallet av akutläkaren på akutmottagningen. Narkosläkare kan kontaktas vid behov.

Sjuksköterskans ansvar på akutmottagningen:

1. Kontrollera att tillgång till syrgas (mask) och revivator finns på salen.
2. Sätt PVK och ge Buffrad Glucos 5%.
3. Koppla upp patienten på övervakningsskåp med 3-5 elektroder, saturation och blodtryck.
4. Ta fram lådan med nervstimulatorn och bedövning som finns i garderoben i rum 36. Bedövningsmedel - Narop 5mg/ml, 20 ml – finns i läkemedelsrummet på IVA.
5. Assistera läkaren vid administreringen av blockaden. Påminn gärna om dokumentation av blockaden i Aweria.
6. Patienten övervakas med puls och blodtryck samt respiration i 5 minuter efter det att blockaden är lagd. Blockaden har en duration på 6-8 timmar.

Symtom på överdosering pga intravasal administrering

Symtom på överdosering kommer vanligen inom några sekunder till minuter

1. CNS biverkan: berusningskänsla, domningar runt munnen och tungan, hyperakusi, tinnitus och synstörningar och senare kramper.
2. Kardiovaskulära: hypotoni, bradycardi/ tackycardi, hypertension, syncope.

Åtgärd vid överdosering enl ovan

Kontakta jourhavande narkosläkare: sök 95200#

Skapa fri luftväg och ge syrgas vid behov.

Läkares ansvar på akutmottagningen:

Se:

[Höft- och femurfraktur Vårdprogram Länsklinik Ortopedi \(nll.se\)](https://www.nll.se/hoft-och-femurfraktur-vardprogram-lansklinik-ortopedi)

Huvudprocess Höft/bäcken	Ansvarig Elise Landenstad	Processledare Elise Landenstad	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id CAREACTSUR-3-199	Godkänt datum 2023-05-15	Version 7.0