

Robotassisterad prostatektomi (RALP)

- gällande rutin

Berörda enheter

Urologkliniken Sunderby Sjukhus.

Syfte

Beskriv vad rutinen syftar till. Samlad information om arbetsrutiner före och efter operationen.

Vårdförlopp

Innehållet i rutinen ska i övrigt svara på frågorna:

Vid behandlingsbeslut

- Behandlingsbeslut, operationsanmälan och narkosbedömning. Sedvanliga förberedelser med prover och EKG.
- HbA1c som rutinprov hos diabetiker vid beslut om prostatektomi.
- Remiss till Hälsocentral (HC) för optimering vid HbA1c >52 hos patient med DM Typ 1 och HbA1c >48 vid diabetes typ II.
- Rökare erbjuds rökavvänjning och remiss till hälsocentral utfärdas för rökavvänjning. Rökstopp 4 veckor före operation.
- Alkoholstopp rekommenderas och remiss till Hc för avvänjning erbjuds.
- Mottagningssjuksköterskan delar ut patientinformation (broschyr) samt enkäter (eProm och Livskvalitetsuppföljning). Patienten informeras om att dessa ska fyllas i och tas med till läkarbesöket 1 - 2 veckor innan operation.
- Uroterapeuten får vetskap om operationen och bokar in patienten för genomgång av bäckenbottenträning.
- När operationsdatum finns, bokar operationsplaneraren in patienten till ett läkarbesök till operatören ca 1 - 2 veckor innan planerad operation.

Vid preoperativt besök, 1 - 2 veckor innan operation

- Läkaren går igenom checklistan med patienten.
- ERAS – preoperativ dryck delas ut till patienten. Denna dryck finns att hämta på Avd. 51.

- Kateter och agrafer ska avvecklas av mottagningsjuksköterska 7 dagar efter operation. Denna kallelse lämnas till patienten.

Vid utskrivning

- Vid utskrivning från vårdavdelning lämnas skriftlig postoperativ information ut av läkaren (Utskrivningsmeddelande efter robotassisterad prostatektomi (RALP)).

Återbesök till mottagningsköterska 7 dagar efter operation

- Avveckling av KAD och agraffer.
- Förskrivning av inkontinensskydd via Guide (Abena formula 0), skicka med patienten skydd så han klarar sig tills dessa kommer.
- Sätta upp patienten på väntelista för PAD-besked 6 veckor efter operation. Inför det besöket ska ett nytt PSA lämnas.
- Skicka med blankett för läckagemätning som patienten ska utföra inför läkarbesöket.

Fortsatt uppföljning

- Läckagemätning och ifyllande av enkäter var 3:e månad, år 1. Därefter var 6:e månad, år 2. Detta ombesörjs av uroterapeuten.

Ovanstående baseras på SOSFS 2005:12 (M)