

# Ryggmärgsstimulering - anestesi kort, AnOpIVA Sunderby sjukhus

## Berörda enheter

- Anestesi, Operationsavdelningen, Sunderby sjukhus

## Anestesiform

- Lokalbedövning, sedering

## Läkemedel

- Lokalanestetika, Ultivasedering

## Typ av tub och dess läge

## Operationsbord

- Planbord

## Patientläge

- Bukläge: Armstöd med armarna fram, rullkuddar under armhåla som stöd. Anpassa efter patient. Stöd under fötterna. Eventuellt upplåsbar kudde under buk.
- Vid inläggning mot nacken (Cervikal stimulering) används ansiktsmask ”Prone-view”. Stor kudde under bröstorg. Vid sidolägesbild så måste armstöd avlägsnas temporärt.

## Postoperativ destination

- Vanligtvis UVA
- Vid behov kontrollera med ansvarig anestesi läkare.

Risk	Åtgärder

## Övrigt

- Operationen görs ofta i två seanser.

1:a seans inläggning av smärtelektrod samt testbatteri.

2:a seans (ungefär 1 vecka senare) utvärderas smärtlindringen. Om denna fungerar adekvat inopereras ett batteri. Vid dålig smärtlindring så avlägsnas smärtelektroden.

- Sidoläge i särskilda fall vid batteribyte där batteri sitter mot buken.
- Vid smärta från angina pectoris implanteras både elektrod samt batteri samtidigt på grund av bra resultat.