

Patientinformation

”Komplikationer” vid protesterapi

► Skavsår

Om det blir för smärtsamt ta ur proteserna och förvara dem enligt anvisning. Försök dock ha proteserna på plats i munnen 1 dygn innan planerat besök hos tandläkaren då det underlättar för tandläkaren att se var proteserna trycker.



► Talsvårigheter

Det är ofta svårt att hitta nya positioner för tungan vid tal. Det kan ta flera månader att få till. Öva hemma via högläsning.

Ibland krävs justering av protes. Tala med din tandläkare.



► Minskad tuggförmåga jämfört med egna tänder

Välj mjukare mat till en början. Men kom ihåg att det aldrig kommer bli samma som med dina egna tänder.

Seg mat, knäckebröd och att bita av hård föda kan vara svårt.



► Smakförlust

Gommen täcks av proteserna vilket ger sämre smakupplevelse.

► **Protesen lossnar/sitter inte fast**

Kom ihåg att det inte är som dina egna tänder. Det är **löständer**.
Prata med din tandläkare om vad som går att göra åt detta. T.ex. protesklister.

Vid t.ex. stroke ändras ibland muskelkrafter kring munnen vilket kan försämra fästet av proteserna.

► **Kindbitning**

Oftast en övergående komplikation.

► **Ökad salivsekretion**

Normalt när något nytt tillförs i munnen. Ger med sig efter några veckor då du vant dig.

► **Inflammation i slemhinna (Stomatit)**

Kan bero på olika saker t.ex. dålig proteshygien, rökning, muntorrhet, svampinfektion mm.

Kontakta din tandläkare.

