

Rinvoq/Upadacitinib

Vad är Rinvoq?	Rinvoq tillhör gruppen januskinashämmare (också kallade JAK-hämmare) och är en medicin som har en inflammationshämmande effekt och som verkar genom att bromsa immunförsvaret. Rinvoq verkar genom att aktiviteten av enzymet januskinas sänks i kroppen och då minskas inflammation vid reumatoid artrit, psoriasisartrit och axial spondylartrit.
Varför skall jag ta Rinvoq?	Den bromsar inflammation och kan därför minska svullnad, smärta, stelhet i och runt lederna samt kan lindra trötthet. Samtidigt som den bromsar skador på dina leders ben och brosk.
Hur lång tid tar det innan Rinvoq ger effekt?	Full effekt förväntas efter drygt 4 månader.
Hur många tabletter skall jag ta varje dag?	Rinvoq är en depottablett som tas en gång dagligen, se recept. Depottabletten sväljs hel med vatten och <i>ska inte delas, krossas, tuggas eller brytas. Undvik mat och dryck som innehåller grapefrukt när du behandlas med Rinvoq då det kan öka risken för biverkningar.</i>
Har Rinvoq några biverkningar?	<p>En del patienter får illamående, ont i magen, infektioner, huvudvärk, trötthet, feber, påverkad blodbild, förhöjda lever- och CK-värden, viktökning, hudutslag, nässelutslag, höga blodfetter och hosta. <i>Ovanliga biverkningar är t.ex. allvarliga överkänslighetsreaktioner, kontakta akut vård direkt om du skulle få denna typ av biverkan.</i></p> <p>Om biverkningar skulle uppträda kontakta Reumatologmottagningen alt. din Hälsocentral.</p>
Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas med Rinvoq?	<p>Du lämnar blodprover på din hälsocentral en gång per månad i tre månader, därefter var tredje månad. Blodprovremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral (eller specialistmottagningen om du bor i Piteå) ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och boka provtagningstid.</p> <p>Tre månader efter start med Rinvoq ska du lämna blodprov för blodfetter som är fasteprover, d.v.s. du skall inte äta eller dricka fr.o.m. kl. 20 kvällen före din provtagning.</p> <p><i>Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.</i></p>
Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Rinvoq?	<p>Meddela alltid din läkare om Du tar andra läkemedel innan du påbörjar behandling med Rinvoq.</p> <p>Fortsättning på nästa sida →</p>

Vad gör jag när jag får en infektion?	Vid infektionstecken som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, hosta m.m. gör Du ett uppehåll med medicinen och vänder Dig vid behov till din hälsocentral. Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll de dagarna Du tar antibiotika.
Vag gör jag med Rinvoq om jag skall opereras?	Du skall göra uppehåll med Rinvoq en vecka före planerad operation och 1-2 veckor efter eller till såret är läkt. Om infektion uppstår blir uppehållet längre.
Kan jag vaccinera mig under Rinvoqbehandling?	Alla vaccinationer med avdödade virus som t.ex. influensavaccin kan tas under behandling. <i>Du skall ej vaccinera dig med ett levande/försvagat vaccin. Kontakta din reumatolog om detta skulle bli aktuellt.</i>
Kan jag ta Rinvoq under graviditet och amning?	Fertila kvinnor och män skall använda effektivt preventivmedel under behandling och minst 4 veckor efter avslutad behandling med Rinvoq. Rinvoq skall inte heller användas under amning.
Vid frågor kontakta	Mottagningsköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via internet 1177.se , nås även via www.norrbotten.se