

Lugnande medicin vid tandbehandling

Midazolam är ett läkemedel som används för att dämpa oro och rädsla inför olika tandbehandlingar. Medlet ges på kliniken som dryck 15-20 minuter före tandbehandling. Om barn har problem med att dricka medicinen kan medlet också ges i ändtarmen 10-15 min före behandling. Det är viktigt att din tandläkare känner till din egen/ditt barns aktuella medicinering för att kunna bedöma om det är lämpligt att ge lugnande medicin.

Du/ditt barn måste ha någon som hämtar dig på kliniken efter behandlingen. Om du så önskar kan följeslagaren vara med under hela behandlingen.

Före behandling

Du/ditt barn ska vara fastande 4 timmar innan behandlingen. Det går bra att dricka ½ glas klar vätska fram till 2 timmar innan behandlingen. Grapefruktjuice ska undvikas tre dygn innan behandlingen.

Efter behandling

Förutom att dämpa ångslan och oro ger medicinen också muskelavslappning. Efter avslutad behandling stannar ni kvar till dess att benen bär ordentligt. Räkna med att det tar minst en timme.

Om du som vuxen ska behandlas

Meddela din tandläkare om du är gravid eller ammar. Du får inte cykla, framföra bil eller annat fordon förrän tidigast efter ett dygn.

Vila de första timmarna efter behandlingen, och planera endast för enkla sysslor resten av dagen.

Om det är ditt barn som ska behandlas

Barnet skall ha en vuxen intill sig vid hemfärd. De tre första timmarna efter behandling ska barnet inte lämnas ensamt och bör även hållas under uppsikt resten av dagen. Detta gäller speciellt om barnet är trött efter behandlingen. Låt inte ditt barn cykla eller leka vilda lekar.

Barn är ofta nyfikna och kan ställa frågor om vad som hände hos tandläkaren. Beröm ditt barn och svara så positivt som möjligt. **Undvik att ge negativa beskrivningar** om själva behandlingen. Det är viktigt att barnets självförtroende stärks inför framtida tandläkarbesök.



Om ni har frågor ta gärna kontakt med Folktandvården.